

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER CANTAL CORRÈZE CREUSE HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélessier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

Région des Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur des Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pélessier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C C P Clermont-Ferrand 5.503-17

Bulletin spécial LIMOUSIN-FRUIT 1981 - n° 8

N° 189

Le 14/05/1981

ARBORICULTURE FRUITIÈRE en Limousin

ARBRES FRUITIERS à PEPINS

Tavelure : pommier , poirier

Le climat perturbé que nous avons connu du 7 au 13 Mai avec des chutes de pluie de l'ordre de 70 à 80 mm nécessite de renouveler la protection avant le 19 Mai (sauf si elle a été réalisée).

A la suite des dernières pluies, la situation sur l'émission d'ascospores est la suivante :

- en laboratoire (sur feuilles reçues de différentes régions)

* sur poirier : elles sont faibles à COUSSAC-BONNEVAL et à OBJAT, notables à BRIVEZAC et ORADOUR-s/VAYRES

* sur pommier : elles demeurent faibles à BRIVEZAC, BUSSIÈRE-BOFFY, CONCEZE, LIMOGES, OBJAT et ORADOUR-s/VAYRES

- dans la nature

* sur poirier et pommier : elles sont faibles à CONCEZE et VERNEUIL-s/VIENNE

Oïdium du pommier

Il est nécessaire de poursuivre la lutte contre cette maladie.

Pucerons

Surveiller les cultures et intervenir si de nouveaux foyers sont décelés.

Acarien rouge :

Dans les vergers où une intervention n'a pas été encore réalisée (absence ou faiblesse des populations) ou dans ceux traités précocement, il est conseillé de procéder à de nouveaux sondages.

ARBRES FRUITIERS à NOYAUX

PRUNIER

Un traitement contre la rouille est recommandé dans les prochains jours.

Utiliser l'une des matières actives suivantes : carbatène, folpel, mancozèbe, manèbe, thiophanate-méthyl, zinèbe, zirame, chlorothalonil.

Si la présence de pucerons ou de chenilles défoliatrices est décelée, intervenir en même temps en ajoutant à la bouillie un insecticide.

CERISIER

Contre l'anthracnose (cylindrosporiose), effectuer un traitement dans les prochains jours.

Les matières actives suivantes peuvent être utilisées : bénomyl, carbendazime, dithianon, doguadine, folpel, manèbe, thiophanate-méthyl.

NOYER

bactériose

En raison du lessivage produit par les dernières pluies, renouveler la protection cuprique conseillée dans le bulletin précédent (n° 7 du 5 Mai)

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION
PHYTOSANITAIRE,

A. FARGEIX